

Badanie wymazu szyjki macicy – Podsumowanie

Badanie wymazu szyjki macicy pomaga w **zapobieganiu** raka, ale go nie wykrywa.

Czym jest wymaz szyjki macicy?

- Szyjka macicy to dolny odcinek macicy.
- Wymaz szyjki macicy sprawdza czy w szyjce macicy występują nieprawidłowe komórki, które z czasem **mogą** przekształcić się w komórki nowotworowe.

Komu zalecane jest badanie wymazu szyjki macicy?

Badanie wymazu szyjki macicy zalecane jest wszystkim kobietom pomiędzy 25 i 64 rokiem życia. U kobiet w wieku 25 - 49 lat zwykle przeprowadza się je co trzy lata. U kobiet w wieku 50 - 64 zwykle przeprowadza się je co pięć lat. Zalecane jest również *niektórym* kobietom powyżej 64 lat.

W jaki sposób przeprowadzane jest badanie wymazu szyjki macicy?

- Lekarz lub pielęgniarka delikatnie rozwiera ścianki pochwy, by szyjka macicy była widoczna.
- Następnie przy pomocy drewnianego patyczka, zwanego szpatułką lub przy pomocy cienkiej szczoteczki delikatnie zeskrobuje próbkę tkanek z powierzchni szyjki macicy.
- Komórki są wysyłane i badane pod mikroskopem w celu wykrycia nieprawidłowości.

Jakich wyników można się spodziewać?

- Wynik 9 na 10 wymazów jest prawidłowy.
- Czasami wynik jest określony jako „niesatysfakcjonujący”, co oznacza, że nie można podać wyniku. Przyczyną tego może być niewyraźny obraz pobranych komórek lub nie pobranie wystarczającej ilości komórek. W takim przypadku pacjentka zostaje poproszona o powtórzenie badania.
- W 1 na 10 badań, wynik jest nieprawidłowy. Oznacza to, że wykryto pewne zmiany w komórkach. **W większości przypadków zmiany te nie oznaczają zmian nowotworowych.**

Wynik badania jest wysyłany do pacjentki i jej lekarza ogólnego. Oczekiwanie na wynik może potrwać 6 - 8 tygodni od momentu przeprowadzenia badania.

Co należy zrobić w przypadku otrzymania nieprawidłowego wyniku wymazu szyjki macicy?

- Lekarz doradzi co należy w takim przypadku zrobić. Decyzja zależy od rodzaju i stopnia wykrytych zmian.
- Zwykle zalecane jest powtórzenie badania wymazu szyjki macicy po upływie 3 - 12 miesięcy. Często kolejne badanie nie wykazuje zmian.
- Jeśli zmiany nie ustąpiły lub nasiliły się, pacjentka skierowana jest na dalsze badania lub leczenie.
- Leczenie jest konieczne w niektórych przypadkach. Nieprawidłowe komórki mogą zostać usunięte poprzez wymrażanie lub drogą laserową. Zahamuje to rozwijanie się raka szyjki macicy w przyszłości.

Czy konieczne jest wykonanie wymazu w przypadku pacjentki po histerektomii?

Zależy to od rodzaju histerektomii i powodu jej przeprowadzenia. Decyzję podejmie lekarz. Na ogół, pacjentka po histerektomii (wycięcie macicy i szyjki macicy) przeprowadzonej z przyczyn nie związanych z rakiem nie musi już mieć wykonywanych wymazów.

© EMIS i PIP 2004 Uaktualniono: marzec 2004 wersja zatwierdzona przez CHIQ

Obszerne informacje dla pacjentów można znaleźć na stronie www.patient.co.uk