

ਪੋਲੀਮਾਈਏਲਜ਼ਿਆ ਰੂਮੈਟੀਕਾ (ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ)

ਪੋਲੀਮਾਈਏਲਜ਼ਿਆ ਰੂਮੈਟੀਕਾ (PMR) ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਕੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੀਰਾਇਡ (steroid) ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। PMR ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 'ਜਾਇੰਟ ਸੈੱਲ ਆਰਟਰਾਇਟਿਸ' (giant cell arteritis) ਨਾਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੋਲੀਮਾਈਏਲਜ਼ਿਆ ਰੂਮੈਟੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਪੋਲੀਮਾਈਏਲਜ਼ਿਆ ਰੂਮੈਟੀਕਾ (PMR) ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 'ਪੋਲੀ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਅਤੇ 'ਮਾਈਏਲਜ਼ਿਆ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

PMR ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ 10,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੂੰ PMR ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੋਲੀਮਾਈਏਲਜ਼ਿਆ ਰੂਮੈਟੀਕਾ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ?

- ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ, ਪੇਡੂ ਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਕੜ ਜਾਣਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਪੀੜ ਅਤੇ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਕੜਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਸਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਕੜਣ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਕਈ-ਕਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ 'ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂਆਂ' ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਦੂਜੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਥਕਾਵਟ, ਉਦਾਸੀ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਬੁਖਾਰ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।

ਪਹਿਚਾਨ ਵਾਲੇ, ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਹੌਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜਾਂ' ਸਮਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਵੋ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

PMR ਦੇ ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਢਾ ਆਕੜ ਜਾਣਾ, ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸੋ (ਗਠਿਆ), ਜਾਂ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। PMR ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ 100% ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ PMR ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਲ PMR ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੋਲੀਮਾਈਏਲਜ਼ਿਆ ਰੂਮੈਟੀਕਾ ਲਈ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ?

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਡਨਿਸੋਲੋਨ (prednisolone), ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਰਾਇਡ ਸੋਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਮੱਧਮ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 15 ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੀ 'ਜ਼ਰੂਰੀ' ਖੁਰਾਕ ਤਕ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 5 ਅਤੇ 8 ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਈ ਗਈ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਤਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ-ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੱਛਣ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਟੀਰਾਇਡ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ

- ਸਟੀਰਾਇਡ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣਾ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।
- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਰਾਇਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੋਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਦ-ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਲਵੋ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਟੀਰਾਇਡ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ 'ਸਟੀਰਾਇਡ ਕਾਰਡ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਓ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇ ਦਬਾਓ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਗੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸਟੀਰਾਇਡ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਡੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 7 ਤੋਂ 10 ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੋਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। PMR ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੀਰਾਇਡ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

- ਓਸਟਿਓਪੋਰੋਸਿਸ (Osteoporosis) ('ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ') - ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ) ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਵੇਗਾ।
- ਭਾਰ ਵੱਧਣਾ
- ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ - ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਿਕਨਪੌਕਸ (ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ) ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲਜ਼ (ਖਲੜੀ ਦਾ ਰੋਗ) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਕਨਪੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
- ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਣਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ।
- ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ (ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ)

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਸਟੀਰਾਇਡਾਂ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਹੀਂ। PMR ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਅਰਾਮ, ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਸਟੀਰਾਇਡ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੋਣ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਪੋਲੀਮਾਈਏਲਜ਼ਿਆ ਰੂਮੈਟਿਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ?

PMR ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 20 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਵਿਅਕਤੀ (ਅਤੇ PMR ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ) ਨੂੰ 'ਜਾਇੰਟ ਸੈੱਲ ਆਰਟਿਰਾਇਟਿਸ' (ਲਹੂ-ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੋਜ਼ਸ਼) ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਹੂ-ਨਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਹੂ-ਨਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਪੁੜਪੜੀ (ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ) ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਹੂ-ਨਾੜੀਆਂ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਜਾਇੰਟ ਸੈੱਲ ਆਰਟਿਰਾਇਟਿਸ' ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦੀ PMR ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PMR ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।

- ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਸੁੱਜਣਾ
- ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦੇਣ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਣੀ।
- ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਕੋਈ ਅੰਗ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਸਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ।

© EMIS and PIP 2005 ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋੜੀ ਗਈ: ਜੂਨ 2005 PRODIGY Validated

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸ੍ਰੋਤ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: www.patient.co.uk